

TRATAMENTE PENTRU COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORILOR LA COACAZ NEGRU SI ROSU

	Perioada aplicării	Boala sau dăunătorul	Denumirea comercială a produsului	Conc. %	Doza Kg,l/ha	Observații
1.	Umflarea mugurilor (aprilie, decada 1)	Antracnoza, fainarea, rugina	Champ 77 WG	0,5%	50 g/10 l apa	
2.	Înfrunzire (aprilie, decada 2 - 3)	Antracnoza, Sfredelitor, fainare	Dithane M-45sau Captan 80 WDG + Envidor 240 SC	0,2% 0,15% 0,04%	2 kg/ha 1,5 kg/ha 0,4 l/ha	Se asociază cu un îngrășământ foliar Foliq Ascovigor 0,3%
3.	Înălțarea inflorescențelor (mai, decada 1)	Antracnoza, făinare, rugina, septorioza	Universalis 593SC Bumper 250 CE + Calipso 480 Scsau Mospilan 20 SP	0,2% 0,02% 0,02% 0,02%	2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha	Se recomandă administrarea în amestec cu Foliq Kombimax 0,3%
4.	Începutul înfloritului (mai, decada 2)	Antracnoza, septorioza, rugina, putregaiul cenușiu, făinare, gărgărița florilor	Topsin M70 sau Tilt 250 EC + Rovral 500 SC + Lamdex 5 EC	0,07% 0,02% 0,1% 0,015%	0,7kg/ha 0,2 l/ha 1 l/ha 0,15 l/ha	Asociat cu îngrășământul foliar Foliq Mikromix 0,1%
5.	Fructe verzi (iunie, decada 1)	Putregaiul cenușiu	Bravo 500 SC + Switch 62,5 WG sau Teldor 500 SC	0,25% 0,1% 0,15%	2,5 l/ha 1 kg/ha 1,5 l/ha	În asociere cu Foliq Calmax 0,3-0,5%
6.	Dupa terminarea recoltarii 2 tratamente in luna august	Antracnoza, fainarea, rugina	Zeamă bordelează	0,3%	3 kg/ha	